

แนวทางการปฏิบัติและการดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีภาวะ **Nonatal Sepsis**

ทารกแรกเกิดมีไข้สูงมากกว่า 38 C

ใช้ปรอทวัดทางรูทวารหนัก ได้ค่าเท่าไรให้ลง 0.5 C ก่อน

ค้นหาสาเหตุ

- การห่อผ้า วิธีแก้ไข : คลายผ้าออกก่อนวัดอุณหภูมิกายใหม่
- ทารกส่องไฟ (On Photo) วิธีแก้ไข : ปิดไฟแล้วนำทารกออกจากที่ส่องไฟอย่างน้อย 20-30 นาที และควรนำทารกมาวัดอุณหภูมิที่เตียงข้างนอก
- อุณหภูมิห้อง วิธีแก้ไข : คลายผ้าเด็กออกก่อนวัดซ้ำ
- ตำแหน่งการวางทารก / สิ่งแวดล้อม วิธีแก้ไข : จัดสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับให้ทารกนอน
- ตาหรือสะดือ วิธีแก้ไข : พยาบาลตรวจสอบความสะอาดตาสะดือทารกตาสะดือและ ผิดปกติ

วัดอุณหภูมิทารกซ้ำหลังจากวัดครั้งแรกประมาณ 1 ชั่วโมง

อุณหภูมิปกติ < 38 C

อุณหภูมิ > 38 C

สังเกตอาการต่อ

พบว่า มีไข้ > 38 C ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป หลังจากค้นหาสาเหตุและแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว

รายงานหัวหน้าเวร

รายงานแพทย์เวร (ติดตามแผนการรักษาของแพทย์)

แพทย์วินิจฉัย **Nonatal Sepsis**

เก็บข้อมูลลงใบบันทึกใบเฝ้าระวัง

รายงาน ICWN

รายงาน ICN